

العربية



iniciadores

IMA cRCT

معلومات عن

الأدوية المضادة لمرض السكري

عن طريق الحقن



مشروع ممول من




European Research Council
Established by the European Commission

مرض السكري في كاتالونيا

تطور مرض السكري

يُصَاعَفُ ضَعْفُ التحكم من خطر الوفاة ومضاعفات الأوعية الدموية. يمكن تصنيف المضاعفات حسب الشرايين المصابة:



١٤%

١٤ من كل ١٠٠ شخص مصابون بالسكري.

يُقدَّر عدد المصابين بمرض السكري بحوالي ٦٠٠٠٠٠ حالة. يصيب مرض السكري ٨% من السكان فوق سن ١٥ و ٢٠% من الأشخاص فوق سن ٦٥.

الشرايين الصغيرة

فقدان البصر	
مرض كلوي	
فقدان الحساسية	
القدم السكرية	

الشرايين الكبيرة

الاصابة بسكتة دماغية	
خطر الإصابة بنوبة قلبية	
البتة	

العديد من مرضى السكري لا يعانون من أعراض ويعتقدون أنهم ليس لديهم مشكلة "عدم القيام بأي شيء" ليس خياراً، فالسكري لا يُعالج نفسه.

إجراءات

إضافية

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

التحكم في ضغط الدم *



نظام غذائي صحي ومتوازن *



تمرين منتظم *



تجنب التبغ والكحول *



التحكم في الوزن *



العلاج

1 من الضروري دائماً اتباع أسلوب حياة صحي ونظام غذائي متوازن ونشاط بدني.

1



2 إذا لم يكن هذا كافياً، فسيتم استعمال العلاج بأدوية إضافية عن طريق الفم أو عن طريق الحقن للمساعدة في السيطرة على مرض السكري.

2




3 إذا لم يكن هذا كافياً، فسيتم استعمال العلاج بأدوية إضافية عن طريق الفم أو عن طريق الحقن للمساعدة في السيطرة على مرض السكري.

3



Insulina rápida

Insulina regular ←	
يخفّض ضغط الدم 	
انخفاض مفاجئ في السكر (نقص سكر الدم)	★★
٨-٦ ساعات 	



Insulina ultrarápida

Insulina aspart / insulina lispro ←	
يخفّض ضغط الدم 	
انخفاض مفاجئ في السكر (نقص سكر الدم)	★★
الأنسولين أسبارت: ٣-٥ ساعات  الأنسولين ليسبرو: ٢-٥ ساعات 	

Insulina larga

Insulina glargina ←	
يخفّض ضغط الدم 	
انخفاض مفاجئ في السكر (نقص سكر الدم)	★★
١٨-٢٤ ساعات 	

Insulina intermedia

Insulina NPH / Insulina detemir ←	
يخفّض ضغط الدم 	
انخفاض مفاجئ في السكر (نقص سكر الدم)	★★
١٦-٢٤ ساعات 	

Agonistas GLP-1

Dulaglutida / Exenatida / Liraglutida ←	
يخفّض ضغط الدم 	
فقدان الوزن 	
يحمي من مشاكل القلب والأوعية الدموية 	
انخفاض مفاجئ في السكر (نقص سكر الدم)	★★
اضطرابات الجهاز الهضمي	★★
دولاجلوتيد: ٧ أيام  إكسسيناتيد: ١٢ ساعة  ليراجلوتيد: ٢٤ ساعة 	

Mezclas de insulina rápida e intermedia

Insulina Regular + NPH / Insulina Lispro + NPL / ← Insulina Aspart + Aspart-Protamina	
يخفّض ضغط الدم 	
انخفاض مفاجئ في السكر (نقص سكر الدم)	★★
٢٤ ساعة 	

نحن نُقَرِّرُ معاً



هل لديك أي سؤال؟

هل توافق
على أخذ
دواء؟

هل تفكر
في خيار لم تناقشه؟

تريد معرفة المزيد؟

متابعة

صيدلية

ممرضة

صفحة الإنترنت



استخدم رمز الاستجابة السريعة للوصول إلى موقع الإنترنت

www.iniciadores.es

خطة شخصية

.....

.....

.....

.....

.....

.....

الموكل المقبل

.....

SJD Parc Sanitari
Sant Joan de Déu

SJD Sant Joan de Déu
Institut de Recerca

Salut/Institut
Català de la Salut

CONSELL DE
COL·LEGIS FARMACÈUTICS
DE CATALUNYA

Salut/ Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya

حصل هذا المشروع على تمويل من مجلس البحوث الأوروبي (ERC) في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار Horizon 2020 (اتفاقية المنحة رقم 948973)